

佐賀県特別栽培農産物認証制度に対応した半促成長期どりアスパラガスの総合防除体系（例）

区分	月旬 ステージ	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			化学成分回数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
基幹防除	物理的防除	近紫外線除去フィルム被覆																														
	耕種的防除	残さ処分・土壌表面焼却 (春芽収穫前)			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効						
	生物的防除	土壌表面の残さを除去した後、丁寧に焼却			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効			アザミウマ類、斑点病に有効						
	物理的防除	見つけ次第除去												7月中下旬に設置 (効果は約3~4ヶ月間)																		
病害	発生活長													褐斑病 斑点病 茎枯病																		
	斑点病	コサイド												アミスターフ												4						
	褐斑病	期間を通じ20~30日間 隔でローテーション防除												同時防除												0						
	茎枯病	ネットWP												同時防除												1						
虫害	発生活長	アザミウマ類												コナジラミ類、ハスモンヨトウ等																		
	アザミウマ類	防除の目安：虫見板への払い落としとして成虫3~6頭以上												スピエースWDG												2						
	アブラムシ類	アザミウマ類												ダントツWP 同時												0						
	ハダニ類	コテツフ												モスピランWP 同時												1						
	コナジラミ類	アザミウマ類												同時 他害虫との同時防除												0						
ハスモンヨトウ等	アザミウマ類												777-AEC												2							
各期間毎の化学成分回数		0			5			3			2			10																		

化学合成農薬ではなく(特別栽培で散布成分数にカウントされない農薬) 農薬の剤型 F:フロアブル、WP:水和(溶)剤、WDG:顆粒水和剤、EC:乳剤