

第1-1表 主な死因の死亡数・死亡率（人口10万対）、全国順位

佐賀県

| 死 因 2)            | 死亡数    |        |           |                   | 死亡率（人口10万対） |         |            | 死亡割合(%) |       | 全国順位(死亡率) |      |
|-------------------|--------|--------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|---------|-------|-----------|------|
|                   | 令和7年   | 令和6年   | 対前年<br>増減 | 対前年比<br>(R6年=100) | 令和7年        | 令和6年    | 令和7年<br>全国 | 令和7年    | 令和6年  | 令和7年      | 令和6年 |
| 全 死 因             | 11 255 | 11 381 | △ 126     | 98.9              | 1 461.7     | 1 464.7 | 1 331.5    | 100.0   | 100.0 | 24        | 24   |
| 悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 > | 2 589  | 2 655  | △ 66      | 97.5              | 336.2       | 341.7   | 317.3      | 23.0    | 23.3  | 21        | 20   |
| 老 衰               | 1 385  | 1 354  | 31        | 102.3             | 179.9       | 174.3   | 179.9      | 12.3    | 11.9  | 33        | 33   |
| 心疾患（高血圧性を除く）      | 1 325  | 1 439  | △ 114     | 92.1              | 172.1       | 185.2   | 184.7      | 11.8    | 12.6  | 40        | 40   |
| 脳 血 管 疾 患         | 735    | 649    | 86        | 113.3             | 95.5        | 83.5    | 84.1       | 6.5     | 5.7   | 24        | 35   |
| 肺 炎               | 733    | 773    | △ 40      | 94.8              | 95.2        | 99.5    | 70.4       | 6.5     | 6.8   | 8         | 8    |
| 誤 嚥 性 肺 炎         | 531    | 571    | △ 40      | 93.0              | 69.0        | 73.5    | 53.9       | 4.7     | 5.0   | 8         | 6    |
| 不 慮 の 事 故         | 284    | 282    | 2         | 100.7             | 36.9        | 36.3    | 37.7       | 2.5     | 2.5   | 38        | 36   |
| 腎 不 全             | 222    | 239    | △ 17      | 92.9              | 28.8        | 30.8    | 24.6       | 2.0     | 2.1   | 21        | 17   |
| ア ル ツ ハ イ マ ー 病   | 197    | 181    | 16        | 108.8             | 25.6        | 23.3    | 21.6       | 1.8     | 1.6   | 24        | 30   |
| 血管性及び詳細不明の認知症     | 133    | 134    | △ 1       | 99.3              | 17.3        | 17.2    | 20.0       | 1.2     | 1.2   | 35        | 37   |

注： 1）令和7年の数値は概数、令和6年の数値は確定数による。  
2）令和7年の全国区における死亡率上位の死因を表章している。

第1-2表 悪性新生物の主な部位別死亡数・死亡率

佐賀県

| 部位別           | 死亡数   |    |       |    |           |                   | 死亡率（人口10万対） |          |            | 死亡割合(%)  |          |
|---------------|-------|----|-------|----|-----------|-------------------|-------------|----------|------------|----------|----------|
|               | 令和7年  |    | 令和6年  |    | 対前年<br>増減 | 対前年比<br>(R6年=100) | 令和<br>7年    | 令和<br>6年 | 令和7年<br>全国 | 令和<br>7年 | 令和<br>6年 |
|               | 死亡数   | 順位 | 死亡数   | 順位 |           |                   |             |          |            |          |          |
| 総 数           | 2 589 |    | 2 655 |    | △ 66      | 97.5              | 336.2       | 341.7    | 317.3      | 100.0    | 100.0    |
| 口唇、口腔及び咽頭     | 54    | 13 | 65    | 13 | △ 11      | 83.1              | 7.0         | 8.4      | 7.3        | 2.1      | 2.4      |
| 食 道           | 68    | 12 | 51    | 14 | 17        | 133.3             | 8.8         | 6.6      | 8.8        | 2.6      | 1.9      |
| 胃             | 260   | 3  | 245   | 4  | 15        | 106.1             | 33.8        | 31.5     | 30.1       | 10.0     | 9.2      |
| 結 腸           | 266   | 2  | 277   | 2  | △ 11      | 96.0              | 34.5        | 35.6     | 31.3       | 10.3     | 10.4     |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸 | 107   | 8  | 106   | 8  | 1         | 100.9             | 13.9        | 13.6     | 13.1       | 4.1      | 4.0      |
| 肝及び肝内胆管       | 186   | 5  | 229   | 5  | △ 43      | 81.2              | 24.2        | 29.5     | 18.4       | 7.2      | 8.6      |
| 胆のう及びその他の胆道   | 125   | 6  | 130   | 6  | △ 5       | 96.2              | 16.2        | 16.7     | 14.1       | 4.8      | 4.9      |
| 膵             | 243   | 4  | 257   | 3  | △ 14      | 94.6              | 31.6        | 33.1     | 35.2       | 9.4      | 9.7      |
| 気管、気管支及び肺     | 460   | 1  | 497   | 1  | △ 37      | 92.6              | 59.7        | 64.0     | 61.9       | 17.8     | 18.7     |
| 乳 房           | 100   | 9  | 115   | 7  | △ 15      | 87.0              | 13.0        | 14.8     | 13.5       | 3.9      | 4.3      |
| 子 宮 (1)       | 46    | 15 | 47    | 15 | △ 1       | 97.9              | 11.4        | 11.5     | 11.8       | 1.8      | 1.8      |
| 卵 巢 (1)       | 31    | 16 | 30    | 16 | 1         | 103.3             | 7.7         | 7.4      | 8.1        | 1.2      | 1.1      |
| 前 立 腺 (2)     | 81    | 11 | 94    | 9  | △ 13      | 86.2              | 22.1        | 25.5     | 23.2       | 3.1      | 3.5      |
| 膀 胱           | 52    | 14 | 66    | 12 | △ 14      | 78.8              | 6.8         | 8.5      | 8.1        | 2.0      | 2.5      |
| 悪性リンパ腫        | 115   | 7  | 84    | 10 | 31        | 136.9             | 14.9        | 10.8     | 11.9       | 4.4      | 3.2      |
| 白 血 病         | 89    | 10 | 68    | 11 | 21        | 130.9             | 11.6        | 8.8      | 8.4        | 3.4      | 2.6      |
| 〔再掲〕大腸        | 373   | －  | 383   | －  | △ 10      | 97.4              | 48.4        | 49.3     | 44.5       | 14.4     | 14.4     |

注： 1）令和7年の数値は概数、令和6年の数値は確定数による。  
2）死亡割合は、端数処理の関係で合計と内訳の計が一致しない場合がある。  
3）(1)は女性の数値、(2)は男性の数値である。  
4）(3)「〔再掲〕大腸」は「結腸」と「直腸S状結腸移行部及び直腸」の合計を示す。  
5）順位は、表に記載している部位別の順位である。