

有害プランクトン情報 R8-1号 第17報

赤潮警報

(伊万里湾)

令和8年7月6日

佐賀県玄海水産振興センター

伊万里湾でシャットネラ属が増殖しています。

7月6日の伊万里湾での調査において、有害種であるシャットネラ属が確認されています。

シャットネラ属の最高細胞密度は、大浦浜港内（水深1.1m）の 1,088細胞/mL です。

シャットネラ属は、魚類に被害を与えます。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。養殖業者等におかれましては、海水の着色や養殖魚類の状況に注意し、以下の対策を検討してください。

☐ 魚類 養殖・蓄養	警報 (シャットネラ属)	・ 喰わせ込みの停止 ・ 早期出荷 ・ 生け簀移動・網丈延長の準備と実行 ・ 淡水浴、薬浴、歯切り等の作業の停止
--	------------------------	--

シャットネラ属 の注意・警戒密度の目安

【対象：魚類】

注意基準：10 細胞数/mL

警戒基準：100 細胞数/mL



シャットネラ属

■ 次のページに、調査地点ごとの細胞密度を示しています。

有害プランクトン情報 R8-1号 第17報

赤潮警報

(伊万里湾)

調査年月日：令和8年7月6日

採水時間：9時46分～10時37分

□ プランクトン細胞数


※ (細胞/ml)

※ (細胞/ml)

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属	コクロディ ニウム属	珪藻類
① 晴気 (水深 19.5 m)	0	0	16	0	660
	5	0	2	0	232
	10	0	0	0	20
	B-1	0	0	0	4
② 阿漕 (水深 22.5 m)	0	0	0	0	21,530
	5	0	6	0	0
	10	0	0	0	4
	B-1	0	0	0	4
③ 大浦浜 (水深 11.5 m)	0	0	0	0	2,510
	1.1	0	480	0	3,860
	5	0	42	0	190
	B-1	0	2	0	2,860
④ 波多津 (水深 7.8 m)	0	0	0	0	6,160
	5	0	4	0	50
	B-1	0	0	0	40
⑤ 福島南 (水深 10.6 m)	0	0	0	0	1,225
	5	0	2	0	91
	B-1	0	0	0	24
⑥ 伊万里港 入口 (水深 12.9 m)	0	0	34	0	17,470
	5	0	0	0	332
	10	0	0	0	60
	B-1	0	0	0	12

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属	コクロディ ニウム属	珪藻類
大浦浜港内 (水深 6.3 m)	1.1	0	1,088	0	1,770

□ 調査地点図



※ 現在、「マルガレフィディニウム属」に名称変更されていますが、本情報では変更前の「コクロディニウム属」で表記しています。

次回の調査は 7月9日（木）の予定です。