

有害プランクトン情報 R8-1号 第16報

赤潮警報

(伊万里湾)

令和8年7月2日

佐賀県玄海水産振興センター

伊万里湾でシャットネラ属が増殖しています。

7月2日の伊万里湾での調査において、有害種であるシャットネラ属が確認されています。

シャットネラ属の最高細胞密度は、**大浦浜（水深1m）**の **1,656細胞/mL**です。

シャットネラ属は、魚類に被害を与えます。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。養殖業者等におかれましては、海水の着色や養殖魚類の状況に注意し、以下の対策を検討してください。


☐ 魚類 養殖・蓄養	警報 (シャットネラ属)	・喰わせ込みの停止 ・早期出荷 ・生け簀移動・網丈延長の準備と実行 ・淡水浴、薬浴、歯切り等の作業の停止
--	------------------------	--

シャットネラ属 の注意・警戒密度の目安

【対象：魚類】

注意基準：10 細胞数/mL

警戒基準：100 細胞数/mL



シャットネラ属

■ 次のページに、調査地点ごとの細胞密度を示しています。

有害プランクトン情報 R8-1号 第16報

赤潮警報

(伊万里湾)

調査年月日：令和8年7月2日


採水時間：8時04分～8時52分

□ プランクトン細胞数

※ (細胞/ml)

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属	コクロディ ニウム属	珪藻類
① 晴気 (水深 20.5 m)	0	0	10	0	608
	5	0	14	0	194
	10	0	0	0	30
	B-1	0	0	0	30
② 阿漕 (水深 29.2 m)	0	0	8	0	1,914
	5	0	42	0	388
	10	0	16	0	168
	B-1	0	10	0	30
③ 大浦浜 (水深 12.1 m)	0	0	8	0	356
	1	0	1,656	0	3,300
	5	0	208	0	204
	10	0	76	0	70
	B-1	0	66	0	36
④ 波多津 (水深 7.6 m)	0	0	12	0	250
	1.5	0	382	0	630
	5	0	170	0	304
	B-1	0	154	0	408
⑤ 福島南 (水深 10.3 m)	0	0	28	0	102
	5	0	18	0	374
	B-1	0	8	0	60
⑥ 伊万里港 入口 (水深 13.8 m)	0	0	0	0	490
	5	0	14	0	96
	10	0	8	0	20
	B-1	0	6	0	0

□ 調査地点図



※ 現在、「マルガレフィディニウム属」に名称変更されていますが、本情報では変更前の「コクロディニウム属」で表記しています。

次回の調査は 7月6日（月）の予定です。