

有害プランクトン情報 R7-1号 第17報

赤潮警報

(伊万里湾)

令和7年8月7日

佐賀県玄海水産振興センター

伊万里湾でカレニア ミキモトイとシャットネラ属が
確認されています。

8月7日の伊万里湾での調査において、有害種であるカレニアミキモトイとシャットネラ属が確認されています。最高細胞密度については、カレニアは造船所前（10m）の86細胞/mL、シャットネラ属は大浦浜（7m）の500細胞/mLです。

カレニア ミキモトイとシャットネラ属は、魚貝類に被害を与えます。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。養殖業者等におかれましては、海水の着色や養殖魚貝類の状況に注意し、以下の対策を検討してください。

☐ 貝類 養殖・蓄養	巻貝	警報	・餌止め（アワビ） ・貝掃除等の作業の停止
☐ 魚類 養殖・蓄養		警報	・餌止め ・移動、出荷、網換え、選別の停止

【留意点】

- ・カレニアやシャットネラは魚貝類のへい死を引き起こす非常に有害なプランクトンです。
- ・海面が着色していなくても、中底層に赤潮を形成していることがあります。
- 特に、アワビ、サザエ等では、海面が着色する前にへい死する可能性があります。

調査地点図



●カレニアミキモトイの注意・警戒密度

【対象：巻貝】

注意基準：10 細胞数/mL

警戒基準：50 細胞数/mL



【対象：魚類・二枚貝】

注意基準：100 細胞数/mL

警戒基準：1,000 細胞数/mL

カレニア ミキモトイ

●シャットネラ属 の注意・警戒密度

【対象：魚類】

注意基準：10 細胞数/mL

警戒基準：100 細胞数/mL



シャットネラ属

■ 次のページに、調査地点ごとの細胞密度を示しています。

有害プランクトン情報 R7-1号 第17報

赤潮警報

(伊万里湾)

調査年月日：令和7年8月7日

採水時間：8時40分～10時30分

□ プランクトン細胞数

(細胞/ml)

(細胞/ml)

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属	珪藻類
① 晴気 (水深 10.8 m)	0	0	0	172
	5	0	0	290
	B-1	0	0	146
② 阿漕 (水深 17.4 m)	0	0	0	1,810
	5	0	0	2,120
	10	0	4	1,520
	B-1	2	14	38
③ 大浦浜 (水深 11.8 m)	0	0	0	1,750
	5	0	372	400
	7	20	500	—
	10	2	198	500
	B-1	2	124	60
④ 波多津 (水深 8.4 m)	0	0	170	52
	1	0	300	—
	5	8	260	20
	B-1	0	248	82
⑤ 福島南 (水深 11.5 m)	0	0	54	400
	5	6	95	10
	B-1	34	200	80
⑥ 伊万里港 入口 (水深 13.6 m)	0	0	8	10
	5	0	24	20
	10	6	40	40
	B-1	68	98	54

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属
瓜ヶ坂 (水深 16.1 m)	13	0	30
大浦浜港内 (水深 6 m)	2.5	4	412
湯野浦 (水深 9.5 m)	8	12	424
福島大橋下 (水深 7 m)	5	4	166
クルマエビ センター前 (水深 10.2 m)	7.5	8	428
造船所前 (水深 16 m)	10	86	56