有害プランクトン情報 R7-3号　第1報

赤潮警報　（仮屋湾）

令和7年8月4日

佐賀県玄海水産振興センター

仮屋湾で有害種のカレニアミキモトイが確認されています

8月4日の仮屋湾での調査において、有害種であるカレニアミキモトイが確認されています。最高細胞密度は、**仮屋**（**B-1m**）の **184 細胞/mL**です。

カレニアミキモトイは、貝類や魚類に被害を与えます。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。魚貝類の養殖や蓄養には十分ご注意ください。

❑ **貝類** **養殖・蓄養**	**巻貝**	警報	・餌止め（アワビ） ・貝掃除等の作業の停止
	二枚貝	注意報	・移動の準備と実行 ・早期出荷
❑ **魚類** 養殖・蓄養		注意報	・喰わせ込みの停止　・早期出荷 ・生け簀移動・網丈延長の準備と実行 ・淡水浴、薬浴、歯切り等の作業の停止

【留意点】
・ｶﾚﾆｱ ﾐｷﾓﾄｲは魚介類のへい死を引き起こす非常に有害なﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝです。
・ｶﾚﾆｱ ﾐｷﾓﾄｲは海面が着色していなくても、中底層に赤潮を形成していることがあります。
特に、アワビ、サザエ等では、海面が着色する前にへい死する可能性があります。

（ｶﾚﾆｱ ﾐｷﾓﾄｲ の注意・警戒密度の目安）
【対象：巻貝】
注意基準：10 細胞数/mL
警戒基準：50 細胞数/mL

【対象：魚類･二枚貝】
注意基準：100 細胞数/mL
警戒基準：1,000 細胞数/mL

カレニア ミキモトイ

■次のページに、調査地点ごとの細胞密度を示しています。

有害プランクトン情報 R7-3号　第1報

赤潮警報　（仮屋湾）

調査年月日：令和7年8月4日

❒ プランクトン細胞数

(細胞/mL)

調査地点	採水層 (m)	**カレニア ミキモトイ**	**シャットネラ属**	珪藻類
仮屋 (水深24.0m)	0	**0**	**0**	5,650
	5	**0**	**0**	700
	10	**0**	**0**	100
	B-1	**184**	**0**	0

❒ 調査地点図



（ｶﾚﾆｱ ﾐｷﾓﾄｲ の注意・警戒密度の目安）
【対象：巻貝】
注意基準：10 細胞数/mL
警戒基準：50 細胞数/mL

【対象：魚類･二枚貝】
注意基準：100 細胞数/mL
警戒基準：1,000 細胞数/mL

カレニア ミキモトイ

佐賀県玄海水産振興センター
普及加工担当　豊福、梅田
☎：0955-74-3021