

海況情報（第1報） -令和7年4月28日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は16.8℃で、前回調査時（3月28日、以下同様）より2.1℃高く、
 平年並みとなっています。

比重：10地点平均は23.0で、前回調査時より1.1高く、平年と比べてやや高くとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は2.3μg-at/Lで、前回調査時より2.2μg-at/L高く、
 平年並みとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.4μg-at/Lで、前回調査時より0.4μg-at/L高く、
 平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は18.2mL/m³で、前回調査時より90.3mL/m³少なく、
 平年並みとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (℃)	17.7	16.9	16.6	16.7	16.9	16.5	16.7	16.9	16.9	15.8	16.8	16.5
比重	22.5	22.9	23.4	23.2	22.5	23.0	23.0	22.9	22.8	23.9	23.0	22.4
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.0	0.1	0.4	0.0	6.9	4.6	4.7	2.0	1.4	2.5	2.3	3.5
DIP(リン) (μg-at/L)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	45.1	19.4	30.3	15.2	9.1	14.5	7.0	13.9	23.0	4.8	18.2	30.9

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移