

海況情報（第3報） -令和7年6月25日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は25.7℃で、前回調査時（5月27日、以下同様）より6.4℃高く、
 平年と比べて甚だ高めとなっています。

比重：10地点平均は15.4で、前回調査時より6.0低く、平年並みとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は5.4μg-at/Lで、前回調査時より1.2μg-at/L低く、
 平年と比べてやや低めとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は1.0μg-at/Lで、前回調査時より0.2μg-at/L高く、
 平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は59.0mL/m³で、前回調査時より48.4mL/m³多く、
 平年と比べて甚だ高めとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (℃)	26.0	26.1	26.1	25.6	25.8	25.7	25.7	25.7	25.8	24.8	25.7	23.3
比重	14.4	15.1	15.5	16.1	16.4	16.1	11.0	16.0	14.3	18.6	15.4	17.5
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	6.0	2.8	0.4	0.1	1.1	2.9	28.6	1.9	8.5	1.5	5.4	18.7
DIP(リン) (μg-at/L)	1.6	1.3	0.7	0.4	0.7	0.6	2.2	0.6	1.1	0.4	1.0	0.9
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	78.5	110.3	42.4	44.2	57.5	66.1	49.4	48.5	55.8	37.6	59.0	17.8

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移