

海況情報（第6報） -令和7年9月22日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は27.2℃で、前回調査時（8月25日、以下同様）より3.1℃低く、平年と比べて甚だ高めとなっています。

比重：10地点平均は21.1で、前回調査時より2.4高く、平年並となっています。

DIN(窒素)：10地点平均は1.2μg-at/Lで、前回調査時より0.6μg-at/L高く、平年よりかなり低めとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は1.4μg-at/Lで、前回調査時より0.1μg-at/L高く、平年値と同じ値となっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は22.1mL/m³で、前回調査時より1.9mL/m³少なく、平年並となっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	27.4	27.6	27.5	27.1	26.9	26.9	27.0	27.2	27.1	27.0	27.2	24.4
比重	20.4	20.2	21.3	21.0	21.1	21.4	21.5	21.3	20.8	22.1	21.1	20.9
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	1.1	0.7	0.3	0.2	2.0	1.5	3.2	2.2	0.9	0.1	1.2	11.8
DIP(リン) (μg-at/L)	1.9	1.6	0.9	1.0	1.3	1.3	1.7	1.6	1.8	0.7	1.4	1.4
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	27.4	12.7	25.5	18.8	30.3	23.0	24.5	16.4	15.8	26.7	22.1	23.0

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移