

海況情報（第12報） -令和7年3月19日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は12.9℃で、前回調査時（2月17日、以下同様）より2.8℃高く、平年と比べてやや高めとなっています。

比重：10地点平均は23.4で、前回調査時より0.4高く、平年と比べてやや高めとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は0.3μg-at/Lで、前回調査時と同じ値で、平年と比べてやや低めとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.2μg-at/Lで、前回調査時と同じ値で、平年並となっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は78.8mL/m³で、前回調査時より321.1mL/m³少なく、平年並となっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	13.1	12.8	12.8	12.7	12.9	12.8	12.8	13.0	13.0	13.0	12.9	11.9
比重	23.1	23.4	23.5	23.5	23.4	23.4	23.3	23.2	23.2	24.1	23.4	21.7
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.9	0.5	0.2	0.3	0.3	3.2
DIP(リン) (μg-at/L)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	136.1	72.1	44.2	43.6	83.0	57.0	99.7	120.0	98.2	33.9	78.8	99.7

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移