

海況情報（第1報） -令和8年4月17日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は16.8℃で、前回調査時（3月19日、以下同様）より3.9℃高く、
 平年と比べてかなり高めとなっています。

比重：10地点平均は22.3で、前回調査時より1.1低く、平年並みとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は2.5μg-at/Lで、前回調査時より2.2μg-at/L高く、
 平年と比べてやや低めとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.5μg-at/Lで、前回調査時より0.3μg-at/L高く、
 平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は21.3mL/m³で、前回調査時より57.5mL/m³少なく、
 平年並みとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	17.6	17.3	16.9	16.7	16.5	16.6	16.5	16.7	16.8	16.5	16.8	14.9
比重	21.4	21.6	22.6	22.7	22.4	21.8	22.9	22.4	22.2	23.1	22.3	22.6
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.1	0.0	0.0	0.0	6.4	7.8	3.2	3.4	4.2	0.2	2.5	5.7
DIP(リン) (μg-at/L)	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.9	0.6	0.3	0.8	0.2	0.5	0.4
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	36.1	41.2	37.0	21.8	3.9	4.2	18.9	14.5	23.6	11.5	21.3	19.4

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移