


海況情報（第4報） -令和8年7月14日調査分-

佐賀県有明水産振興センター

- 水 温 : 10地点平均は29.2℃で、前回調査時（6月16日、以下同様）より5.5℃高く、
平年と比べて甚だ高めとなっています。
- 比 重 : 10地点平均は11.1で、前回調査時より11.8低く、平年並みとなっています。
- DIN(窒素) : 10地点平均は0.5μg-at/L で、前回調査時より0.3μg-at/L低く、平年と比べて
やや低めとなっています。
- DIP(リン) : 10地点平均は0.1μg-at/Lで、前回調査時より0.5μg-at/L低く、平年と比べて
やや低めとなっています。
- プランクトン沈殿量 : 10地点平均は63.1mL/m³ で、前回調査時より49.0mL/m³多く、
平年と比べてやや高めとなっています。




■ DIN（窒素）の表層における水平分布

■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水 温 (℃)	30.3	30.1	28.3	29.2	29.2	29.4	29.4	29.3	29.7	27.5	29.2	26.3
比 重	9.3	9.4	11.7	11.5	12.2	11.5	11.3	10.2	9.6	14.3	11.1	13.4
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.3	0.6	0.4	0.0	1.1	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	16.6
DIP(リン) (μg-at/L)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	32.8	24.8	37.0	34.5	143.7	20.6	17.3	57.0	236.0	27.3	63.1	33.0

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。
※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。
※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移