

米づくり情報(平坦部) 第5号

令和7年7月31日

佐賀県農業試験研究センター 本場

本年産水稻の生育状況(7月30日)

移植日	項目 品種	年 次	草 丈 cm	茎 数 本／㎡	葉 齢 L	葉 色 SPAD	概 況 (平年または前年との比較)
6月18日	夢しずく	本 年	77.9	363	11.5	40.5	【気象】 7月23日～29日まで ◆平均気温…2.9℃高い ◆日照時間…長い (平年比 176%) ◆降水量…少ない (平年比 0%) 【生育】 ◆草丈 全品種で高い。 ◆茎数 「夢しずく」、「ヒノヒカリ」は少なく、「ひなたまる」、「さがびより」、「ヒヨクモチ」は多い。 ◆葉齢 「夢しずく」は平年並み、その他の品種はやや進んでいる。 ◆葉色(SPAD 値) 「夢しずく」はやや濃く、「ヒノヒカリ」、「さがびより」、「ヒヨクモチ」は平年並み、「ひなたまる」はやや淡い。
		平 年	72.6	415	11.5	39.1	
		平年比(差)	107	87	(±0)	(+1.4)	
	ヒノヒカリ	本 年	70.3	462	11.9	39.7	
		平 年	66.4	545	11.5	40.1	
		平年比(差)	106	85	(+0.4)	(-0.4)	
ひなたまる	本 年	70.4	453	12.2	41.3		
	前 年	62.0	335	12.0	42.8		
	前年比(差)	114	135	(+0.2)	(-1.5)		
6月20日	さがびより	本 年	70.0	579	11.8	40.3	
		平 年	63.3	535	11.6	39.9	
		平年比(差)	111	108	(+0.2)	(+0.4)	
	ヒヨクモチ	本 年	66.3	893	12.3	40.2	
		平 年	58.5	824	12.1	40.8	
		平年比(差)	113	108	(+0.2)	(-0.6)	
留意点	○「夢しずく」は幼穂形成期を迎えているため、穂肥診断に基づき遅れないように穂肥を施用する。 ○「ひなたまる」「ヒノヒカリ」「さがびより」「ヒヨクモチ」等の中晩生品種は、中干しが終わり次第、間断灌水に切り替える。茎数が少ない圃場では中干しはやや軽めにとどめ、幼穂形成期前には終了する。 ○病害虫の発生に注意する。農業技術防除センターの情報を参考にするとともに、圃場の観察により防除を的確に行う。						

注1)「夢しずく」、「ひなたまる」、「ヒノヒカリ」は、6月18日移植の稚苗(播種期 5/26, 播種量 湿粳 180g/箱)

「さがびより」、「ヒヨクモチ」は、6月20日移植の稚苗(播種期 5/27 播種量 湿粳 180g/箱)

2)栽植密度:「夢しずく」は、条間 30 cm×株間 17 cm, 19.6 株/㎡(65 株/坪)

「ひなたまる」は、条間 30 cm×株間 18 cm, 18.5 株/㎡(60 株/坪)

「さがびより」は、条間 30 cm×株間 20 cm, 16.7 株/㎡(55 株/坪)

「ヒノヒカリ」「ヒヨクモチ」は、条間 30 cm×株間 15 cm, 22.2 株/㎡(73 株/坪)

3)栽培管理:施肥法は県基準に準じ、防除他はセンターの慣行による。

4)平年値は、収量について過去の全試験年次の標準偏差(σ)を算出し、±1σの外側にある年次を除く年次を対象にした、各項目の単純平均値。

5)「ひなたまる」については R6 年産から試験開始のため、前年との比較。

6)概況欄の平年値との比較については、以下のように定義している。

低い(少ない): 94 以下、やや低い(やや少ない): 95～98、平年並み: 99～101、

やや高い(やや多い): 102～105、高い(多い): 106 以上。

【窒素の時期別施用量 (N kg/10a)】

品 種	基 肥	中 追	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ	実 肥
夢しずく	3.0	0.0	2.0(7/30)	—	—
ヒノヒカリ	4.0	2.0(7/9)	3.0	—	—
ひなたまる	4.0	2.0(7/9)	3.0	—	—
さがびより	5.0	0.0	2.0	—	—
ヒヨクモチ	4.0	3.0(7/16)	4.0	1.5	1.5

※括弧内の日付は農試作況圃場における施用日

【農試作況圃場における幼穂形成始期と出穂期】

品 種	幼穂形成期(1mm)		出穂期	
	本年(平年差)	平年	本年(平年差)	平年
夢しずく	7/26(-2)	7/28	未	8/17
ヒノヒカリ	未	8/4	未	8/27
ひなたまる	未	8/2	未	8/25
さがびより	未	8/9	未	9/1
ヒヨクモチ	未	8/14	未	9/5

※7/30 現在 「夢しずく」 主茎幼穂長 2mm 程度




「ひなたまる」 主茎幼穂長 0.3mm程度

「ヒノヒカリ」 は確認できていない

令和7年産 稲作期間気象図

アメダス観測値(佐賀)

農業試験研究センター
作物栽培研究担当



●病害虫に関する情報は以下のリンク(農業技術防除センター病害虫防除部)より確認ください。

<https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html>