

米づくり情報(平坦部) 第4号

令和8年7月23日

佐賀県農業試験研究センター 本場

本年産水稻の生育状況(7月23日)

移植日	項目 品種	年次	草丈 cm	茎数 本／m ²	葉 齢 L	葉色 SPAD	概 況 (平年と平均の比較)
6月18日	夢しずく	本 年	61.6	355	10.3	38.9	【気象】 7月16日～22日まで ◆平均気温…2.6℃高い ◆日照時間…長い (平年比 115%) ◆降水量…少ない (平年比 0.8%) 【生育】 ◆草丈 「ひなたまる」は平年並み、「夢しずく」、「ヒノヒカリ」はやや高く、「さがびより」、「ヒヨクモチ」は高い。 ◆茎数 「夢しずく」、「ヒノヒカリ」、「さがびより」は少なく、「ひなたまる」、「ヒヨクモチ」は多い。 ◆葉齢 「ひなたまる」はやや少なく、「夢しずく」は平年並み、「ヒノヒカリ」、「さがびより」、「ヒヨクモチ」はやや多い。 ◆葉色(SPAD 値) 「夢しずく」は平年並み、「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」、「さがびより」、「ヒヨクモチ」はやや淡い。
		平 年	60.0	403	10.4	39.3	
		平年比(差)	103	88	(-0.1)	(-0.4)	
	ヒノヒカリ	本 年	54.7	499	10.8	40.6	
		平 年	53.7	557	10.5	41.3	
		平年比(差)	102	90	(+0.3)	(-0.7)	
ひなたまる	本 年	59.7	474	10.7	43.1		
	平均(2 か年)	60.1	367	11.0	44.1		
	平均比(差)	99	129	(-0.3)	(-1.0)		
6月19日	さがびより	本 年	56.6	446	10.7	40.1	
		平 年	50.2	506	10.4	41.2	
		平年比(差)	113	88	(+0.3)	(-1.1)	
	ヒヨクモチ	本 年	55.0	887	11.2	41.8	
		平 年	48.2	819	11.0	43.0	
		平年比(差)	114	108	(+0.2)	(-1.2)	
留意点	○「ヒヨクモチ」を除いて分げつの発生が鈍化しており、「夢しずく」、「ヒノヒカリ」、「さがびより」の茎数は平年を下回っている。一方、11葉目葉身の伸長により、草丈は全品種で急激に伸長し、平年並みから平年を上回っている						
	○「夢しずく」は、幼穂形成期(平年7月28日)までには中干しを終了し、穂肥診断に基づき穂肥を施用する。その後は間断灌水に切り替える。						
	○必要な茎数が確保された「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」、「さがびより」、「ヒヨクモチ」等の中晩生品種は、速やかに中干しを実施する。高温乾燥傾向であるため、過度な中干とならないよう注意する。						
	●病害虫に関する情報は以下のリンク(農業技術防除センター病害虫防除部)より確認ください。 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html						

注1)「夢しずく」、「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」は、6月18日移植の稚苗(播種期5/26、播種量 湿粳 180g/箱)

「さがびより」、「ヒヨクモチ」は、6月19日移植の稚苗(播種期5/27 播種量 湿粳 180g/箱)

2)栽植密度:「夢しずく」は、条間30cm×株間17cm、19.6株/m²(65株/坪)

「ひなたまる」は、条間30cm×株間18cm、18.5株/m²(60株/坪)

「さがびより」は、条間30cm×株間20cm、16.7株/m²(55株/坪)

「ヒノヒカリ」「ヒヨクモチ」は、条間30cm×株間15cm、22.2株/m²(73株/坪)

- 3)栽培管理:施肥法は県基準に準じ、防除他はセンターの慣行による。
- 4)平年値は、収量について過去の全試験年次の標準偏差(σ)を算出し、 $\pm 1\sigma$ の外側にある年次を除く年次を対象にした、各項目の単純平均値を7月23日に換算した値。
- 5)「ひなたまる」についてはR6年産から試験開始のため、過去2か年の平均との比較。
- 6)概況欄の平年値との比較については、以下のように定義している。
 低い(少ない):94以下、やや低い(やや少ない):95~98、平年並み:99~101、
 やや高い(やや多い):102~105、高い(多い):106以上。

【窒素の時期別施用量 (N kg/10a)】

品 種	基 肥	中 追	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ	実 肥
夢しずく	3.0	0.0	2.0	—	—
ヒノヒカリ	4.0	2.0(7/10)	3.0	—	—
ひなたまる	4.0	2.0(7/10)	3.0	—	—
さがびより	5.0	0.0	2.0	—	—
ヒヨクモチ	4.0	3.0(7/16)	4.0	1.5	1.5

※括弧内の日付は農試作況圃場における施用日

【農試作況圃場における幼穂形成始期と出穂期】




品 種	幼穂形成期(1mm)		出穂期	
	本年(平年差)	平年	本年(平年差)	平年
夢しずく	未	7/28	未	8/17
ヒノヒカリ	未	8/4	未	8/27
ひなたまる	未	8/3	未	8/25
さがびより	未	8/9	未	9/1
ヒヨクモチ	未	8/14	未	9/5

※7/23 現在 「夢しずく」主茎幼穂長 0.2mm 程度

令和8年産 稲作期間気象図


アメダス観測値(佐賀)

農業試験研究センター
作物栽培研究担当




【生育状況の比較】


「夢しずく」




「ヒノヒカリ」



「ひなたまる」



「さがびより」



「ヒヨクモチ」

