

米づくり情報(平坦部) 第 10 号

令和 8 年 9 月 3 日

佐賀県農業試験研究センター 本場

本年産水稻の生育状況（9 月 3 日）及び生育ステージ

移植日	項目 品種	年次	草丈 cm	茎数 本/m ²	葉色 SPAD	止葉 葉数	概要 (平年及び平均との比較)
6月19日	ヒヨクモチ	本年 平年 平年比(差)	81.7 ※平年データなしのため本年値のみ	680	38.7	16.1 15.9 +0.2	【気象】 8月27～9月2日まで ◆平均気温…4.3℃高い ◆日照時間…長い (平年比 163%) ◆降水量…少ない (平年比 1%)
			幼穂形成 始期	出穂期	成熟期		
6月18日	夢しずく	本年 平年 平年比(差)	7/27 7/28 (-1)	8/15 8/17 (-2)	未 9/23 —		【生育】 ◆止葉葉位 「ヒヨクモチ」は平年並み。
	ヒノヒカリ	本年 平年 平年比(差)	8/4 8/4 (±0)	8/25 8/27 (-2)	未 10/8 —		【出穂期】 「さがびより」…3日早い
	ひなたまる	本年 平均(2か年) 平均比(差)	8/5 8/3 (+2)	8/26 8/25 (+1)	未 10/9 —		「ヒヨクモチ」は走り穂がみられている(出穂期予測 9月5日頃)。
6月19日	さがびより	本年 平年 平年比(差)	8/8 8/9 (-1)	8/29 9/1 (-3)	未 10/13 —		
	ヒヨクモチ	本年 平年 平年比(差)	8/15 8/15 (+1)	未 9/5 —	未 10/28 —		
留意点	○「さがびより」は出穂期を迎えており、「ヒヨクモチ」もまもなく出穂期を迎える ○施肥管理:「ヒヨクモチ」分施肥圃場では、施肥基準に基づき実肥を適切に施用する。 ○水管理:穂揃期までは間断灌水の湛水期間を長めにするように心がける、穂揃期以降は通常の間断灌水に切り替え、土壌を固めるとともに根の活力維持を図る。 早期落水は、未熟粒や死米の増加など、品質低下の原因となるため、収穫 1 週間前まで飽水管理(足跡や溝に少し水が残る程度で再び浅く入水することを繰り返し、土壌を常に湿った状態に保つ)や間断灌水を行う(用水が不足している地域では黒乾状態の維持に努める)。 ○病虫害発生予察情報予報第5号(9月の予報)で、普通期水稻では、トビイロウンカ“やや多”、コブノメイガ“多”、斑点米カメムシ類“多”となっている。地域での発生状況を確認し、適期防除に努める。 ●病虫害に関する情報は以下のリンク(農業技術防除センター病虫害防除部)より確認ください。 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html						

注 1)「夢しずく」、「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」は、6 月 18 日移植の稚苗(播種期 5/25, 播種量 湿粳 180g/箱)
「さがびより」、「ヒヨクモチ」は、6 月 19 日移植の稚苗(播種期 5/26 播種量 湿粳 180g/箱)

2)栽植密度:「夢しずく」は、条間 30 cm×株間 17 cm, 19.6 株/m²(65 株/坪)
「ひなたまる」は、条間 30 cm×株間 18 cm,18.5 株/m²(60 株/坪)
「さがびより」は、条間 30 cm×株間 20 cm, 16.7 株/m²(55 株/坪)
「ヒノヒカリ」「ヒヨクモチ」は、条間 30 cm×株間 15 cm, 22.2 株/m²(73 株/坪)

3)栽培管理:施肥法は県基準に準じ、防除他はセンターの慣行による。

4)平年値は、収量について過去の全試験年次の標準偏差(σ)を算出し、±1σの外側にある年次を除く年次を対象にした、各項目の単純平均値。

5)「ひなたまる」については R6 年産から試験開始のため、過去2か年の平均値との比較。

6)概況欄の平年値との比較については、以下のように定義している。

低い(少ない):94 以下、やや低い(やや少ない):95～98、平年並み:99～101、

やや高い(やや多い):102～105、高い(多い):106 以上。

【窒素の時期別施用量(N kg／10a)】

品 種	基 肥	中 追	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ	実 肥
夢しずく	3.0	0.0	2.0 (7/30)	—	—
ヒノヒカリ	4.0	2.0 (7/10)	3.0 (8/7)	—	—
ひなたまる	4.0	2.0 (7/10)	3.0 (8/7)	—	—
さがびより	5.0	0.0	2.0 (8/17)	—	—
ヒヨクモチ	4.0	3.0 (7/16)	4.0 (8/20)	1.5 (8/27)	1.5




※括弧内の日付は農試作況圃場における施用日

令和8年産 稲作期間気象図

アメダス観測値(佐賀)


農業試験研究センター

作物栽培研究担当




【生育状況の比較】


「夢しずく」




「ヒノヒカリ」



「ひなたまる」



「さがびより」



「ヒヨクモチ」

