

疾患名	パターン	接種が必要なワクチン(必要回数)		留意事項
ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ		4種混合:DPT-IPV (4回)	2種混合:DT (1回)※2	これからDPTワクチン、不活化ポリオワクチンの接種を始める場合、4種混合ワクチンを使用。 (3種混合の接種を完了している場合や生ポリオワクチンを2回接種済みの場合、不活化ポリオワクチンを4回接種済みの場合は、接種医にご相談ください。) ※1:1期初回でDTを接種する場合、1期のDTと不活化ポリオの回数が異なるので注意 ※2:最後の2混は、接種量が0.1ml(その他は0.5ml)なので注意。
		3種混合:DPT+単 独不活化ポリオ(4 回)		
		2種混合:DT(3回) ※1+単独不活化 ポリオ(4回)		
麻しん 風しん	(1)	麻しん風しん混合(2回)		【1回目】生後1歳～2歳に至るまで 【2回目】5歳以上7歳未満の者で小学校入学前 の1年間
	(2)	麻しん単独(2回)	風しん単独(2回)	
日本脳炎		日本脳炎(4回)		標準的な接種開始年齢は、3歳から。 接種量が年齢によって異なるので注意。 (3歳以上0.5ml/回、3歳未満0.25ml/回)
結核		BCG(1回)		標準的な接種期間は、生後5月～生後8月
小児の 肺炎球菌感染 症	小児用肺炎球菌ワクチン(1～4回)			
	(1)	生後2か月～7か 月までに開始	4回	接種開始年齢で接種回数が異なるので注意。
	(2)	生後7か月～1歳ま でに開始	3回	
	(3)	1歳～2歳までに開 始	2回	
	(4)	2歳～5歳までに開 始	1回	
Hib感染症 (ヒブ)	ヒブワクチン(1～4回)			
	(1)	生後2か月～7か 月までに開始	4回	接種開始年齢で接種回数が異なるので注意。
	(2)	生後7か月～1歳ま でに開始	3回	
	(3)	1歳～5歳までに開 始	1回	
ヒトパピローマ ウイルス感染症 予防接種	(子宮頸がん予防ワクチン)サーバリックス(2 価)、ガーダシル(4価)の2種類あり。 ※いずれも計3回接種。		同じワクチンを最後まで使用すること。 標準的な接種期間は、13歳となる日の属する年 度の初日から当該年度の末日までの間。	
水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン(2回):1歳から3歳まで		1回目と2回目は3月以上の間隔を置いて接種。	
B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン(3回):0歳(1歳に 至るまでの間にある者)		標準的な接種期間は生後2月に至った時 から 生後9月に至るまで	
ロタウイルス 感染症 (R2.10～)	ロタリックス(2回):出生6週0日後から 24週0日後までの間にある者		同じワクチンを最後まで使用すること。 初回接種については、生後2月に至った日から 出生14週6日後までの間に接種を行う。 27日以上の間隔を置いて接種する。	
	ロタテック(3回):出生6週0日後から32 週0日後までの間にある者			
高齢者の インフルエンザ	インフルエンザワクチン(1回):65歳以上の方 ※60歳～65歳未満の一部の方も接種を受ける ことができます。		接種時期は10月～12月。 ※1月以降は全額自己負担となりますが、任意 接種は可能です。	
高齢者の 肺炎球菌感染 症	23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(1 回) ※対象年齢については、お住まいの市町に御確 認ください。		これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド ワクチンを1回以上接種した者は、定期接種の対 象とはなりません。	
風しんの第5期 の定期接種	麻しん風しん混合(1回) ※令和4年(2022年)3月31日までの時限措置。		昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979 年)4月1日生まれの男性で風しん抗体価がHI法8 倍以下またはHI法8倍以下相応の者が対象。 対象者には、お住まいの市町より抗体検査及び 予防接種のクーポン券が送付されます。 ※クーポン券の送付の詳細については、お住ま いの市町に御確認ください。	