年報（年間測定結果）

2025年度

測定項目：浮遊粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の割合	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1時間値の合計	環境基準達成状況	測定方法					
			（日）	（時間）	(mg/m3)	（時間）	(%)	（日）	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(mg/m3)	（有×無〇）	（日）	(mg/m3)	（達成〇）						
一般	佐賀	住	362	8703	0.014	0	0.0	0	0.0	0.101	0.051	0.030	〇	0	120.539	〇	β線吸収法					
一般	神埼	未	363	8705	0.014	0	0.0	0	0.0	0.130	0.052	0.029	〇	0	126.045	〇	β線吸収法					
一般	三瀬	未	362	8698	0.012	0	0.0	0	0.0	0.105	0.047	0.028	〇	0	103.490	〇	β線吸収法					
一般	多久	住	362	8702	0.013	0	0.0	0	0.0	0.092	0.046	0.030	〇	0	110.537	〇	β線吸収法					
一般	鳥栖	住	363	8703	0.016	0	0.0	0	0.0	0.131	0.064	0.037	〇	0	137.143	〇	β線吸収法					
一般	基山	住	358	8629	0.013	0	0.0	0	0.0	0.096	0.049	0.033	〇	0	115.787	〇	β線吸収法					
一般	唐津	住	362	8705	0.014	0	0.0	0	0.0	0.105	0.040	0.033	〇	0	118.523	〇	β線吸収法					
一般	竹木場	未	363	8693	0.014	0	0.0	0	0.0	0.106	0.042	0.032	〇	0	120.513	〇	β線吸収法					
一般	大坪	住	362	8705	0.014	0	0.0	0	0.0	0.094	0.041	0.030	〇	0	119.904	〇	β線吸収法					
一般	山代	未	362	8692	0.014	0	0.0	0	0.0	0.095	0.046	0.036	〇	0	124.352	〇	β線吸収法					
一般	武雄	商	362	8675	0.014	0	0.0	0	0.0	0.098	0.051	0.033	〇	0	124.454	〇	β線吸収法					
一般	白石	未	363	8706	0.014	0	0.0	0	0.0	0.114	0.045	0.031	〇	0	125.262	〇	β線吸収法					
一般	鹿島	住	362	8701	0.013	0	0.0	0	0.0	0.095	0.052	0.030	〇	0	116.863	〇	β線吸収法					
一般	嬉野	住	362	8703	0.013	0	0.0	0	0.0	0.090	0.045	0.030	〇	0	111.263	〇	β線吸収法					
自排	兵庫	未	363	8709	0.014	0	0.0	0	0.0	0.134	0.043	0.030	〇	0	120.875	〇	β線吸収法					
自排	曽根崎	準工	363	8710	0.016	0	0.0	0	0.0	0.125	0.056	0.035	〇	0	136.182	〇	β線吸収法					
集計値			5794	139139	0.014	0	−	0	−	0.134	0.064	−	−	0	1931.732	−	−					