年報（年間測定結果）

2025年度

測定項目：微小粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日平均値が35μg/m3を超えた日数の割合	98%評価による日平均値が35μg/m3を超えた日数	環境基準達成状況	測定方法	機種	等価性の有無	更新年月日							
			（日）	（時間）	（μg/m3）	（μg/m3）	（μg/m3）	（日）	（%）	（日）	（達成○）											
一般	佐賀	住	363	8709	9.8	26.8	21.6	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	神埼	未	363	8709	10.3	31.6	22.3	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	三瀬	未	363	8705	9.2	27.8	19.6	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	多久	住	360	8674	9.8	26.6	22.4	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	鳥栖	住	363	8707	9.5	25.9	21.5	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	唐津	住	363	8714	8.6	26.3	18.7	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	肥前	未	363	8711	8.4	35.2	19.2	1	0.3	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	大坪	住	363	8707	10.1	30.2	21.5	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	武雄	商	361	8691	9.6	28.0	20.6	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	白石	未	362	8689	10.7	28.4	23.3	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	鹿島	住	362	8702	9.6	27.9	21.3	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
一般	嬉野	住	363	8705	9.2	28.3	20.4	0	0.0	0	○	β線吸収法	PM-712	有								
集計値			4349	104423	9.6	35.2	－	1	－	0	－	－	－	－	－							