

ナシ定期調査結果(令和7年8月上旬及び中下旬)

圃場名	病害虫名	調査月日：伊万里市8月21日			備 考
		黒星病	ハダニ類	チュウゴク ナシキジラミ	
		葉 100枚	葉 100枚	葉 100枚	
南波多町 1-1		0	0	0	露地・幸水
松浦町 1-1		0	3	0	露地・幸水
松浦町 2-1		0	0	0	露地・幸水
大川町 2		0	4	0	露地・幸水
大川町 3-1		0	1	0	露地・幸水
南波多町 1-2		0	4	0	トンネル・幸水
松浦町 1-2		0	0	0	トンネル・幸水
松浦町 2-2		0	2	0	トンネル・幸水
大川町 3-2		0	4	0	トンネル・幸水
発生圃場率（露地）		0	60.0	0	
平均発生率（露地）		0	1.6	0	露地の平均
（トンネル）		0	2.5	0	トンネルの平均
（露地＋トンネル）		0	2.0	0	露地＋トンネルの平均
発生率の平年値		0.7	9.2	1.5	
平年比		並	やや少	やや少	
発生率の前年値		0.0	11.6	0.0	

調査月日：伊万里市8月4日				備 考
黒星病(幸水)	黒斑病(幸水)	ハダニ類	チュウゴク ナシキジラミ	
果 100果	果 100果	葉 100枚	葉 100枚	
0	0	2	0	露地・幸水
0	0.0	1	0	露地・幸水
0	0	1	0	露地・幸水
0	0	7	0	露地・幸水
0	0	97	0	露地・幸水
0	0	1	0	トンネル・幸水
0	0	0	0	トンネル・幸水
－	0	3	0	トンネル・幸水
－	0	91	0	トンネル・幸水
0	0	100.0		
0	0	21.6		露地の平均
0	0	23.8		トンネルの平均
0	0	22.6		露地＋トンネルの平均
3.2				
並				
5.5				

赤星病、輪紋病、黒斑病等の被害については調査葉数（または果数）及び被害（寄生）葉数（または果数）を「その他病害虫等」に記入する。