

大豆定期調査結果（令和8年8月下旬）

調査月日：8月17～20日											50株調査
調査地点	ハスモンヨトウ幼虫		白変葉 (%)	カメムシ類 (%)	ハダニ類 (%)	アブラムシ 類 (%)	コナジラミ 類 (%)	フタスジヒメ ハムシ (%)	葉焼病 (%)	べと病 (%)	備考
	寄生 (%)	齢期									
A地区 ①	0		4	0	2	0	0	0	0	0	シロイモシヨトウ16%
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	オオタバコガ12%、シロイモシヨ トウ4%
B地区 ①	0		0	0	0	0	0	2	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	オオタバコガ2%
C地区 ①	0		0	0	0	0	0	2	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
D地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
E地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
F地区 ①	2	若	0	0	2	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	4	0	0	0	オオタバコガ2%
G地区 ①	4	若～中	0	2	0	0	0	0	0	0	オオタバコガ2%
〃 ②	2	若～中	0	2	0	0	4	0	0	0	
H地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
I地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
J地区 ①	2	若	2	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
K地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
発生圃場率	18.2		9.1	9.1	9.1	0	9.1	9.1	0	0	
平均発生株率	0.5		0.3	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0	0	
発生率の平年値	1.4		0.8	0.2	0.5	0.0	0.7	—	0.4	1.9	
（平年比）	やや少		やや少	並	並	並	並	—	並	やや少	
発生率の前年値	0.5		0.6	0.5	0.1	0	4.0	0.0	0.3	0	