

早植え水稻定期調査結果(令和8年9月)

25株調査

調査月日：9月1日																				
調査地点		品種	穂いもち		紋枯病		セジロウンカ			トビイロウンカ				ヒメトビウンカ		コフノメイガ	マダヒコヤガ	備考		
			発生株率	発病程度	発生株率	発病程度	寄生株率	最高頭数 成虫	頭数 幼虫	幼虫の 羽化の	寄生株率	最高頭数 成虫	頭数 幼虫	幼虫の 年齢	短翅雌 成虫	寄生株率	最高頭数 成虫		頭数 幼虫	発生株率
D地区	①	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0	0	内穎褐変病8% ごま葉枯病4%、内 穎褐変病12%
	②	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0	0	
	③	夢しずく	0		0		0			0					0			0	0	
	④	夢しずく	0		0		0			0					0			0	0	
E地区	①	コシヒカリ	0		0		4		1	中	0				0			0	0	クモヘリカメシ、ミナミアカメ シ、内穎褐変病20% 内穎褐変病16%
	②	夢しずく	0		0		8		1	中老	0				0			0	0	
	③	夢しずく	0		0		0			0					0			0	0	
	④	夢しずく	0		16	中	0			0					0			0	0	
F地区	①	にじのきらめき	0		12	中	0				0				0			0	0	イネカメシ、イネコカメシ
	②	夢しずく	0		0		0				0				0			0	0	イネカメシ
	③	コシヒカリ	0		0		12		1	中	0				0			0	0	クモヘリカメシ
	④	コシヒカリ	0		0		8	1	1	中	0				0			0	0	イネカメシ、イネコカメシ
発生圃場率			0		16.7		33.3				0				0			0	0	
平均発生率			0		2.3		2.7				0				0			0	0.0	
発生率の平年値			3.9		2.3		2.8				10.6				3.9			0.2	0.5	
(平年比)			やや少		並		並				並				やや少			並	やや少	
発生率の前年値			0.7		0.7		0.3				0.3				1.0			0	0	