

大豆定期調査結果（令和8年9月上旬）

調査月日：9月1～4日											50株調査
調査地点	ハモンヨトウ幼虫		白変葉 (%)	カメムシ類 (%)	ハダニ類 (%)	アブラムシ 類 (%)	コナジラミ 類 (%)	フタスジ ヒメハムシ (%)	葉焼病 (%)	べと病 (%)	その他病害虫
	寄生 (%)	齢期									
A地区 ①	0		0	0	16	0	0	0	0	0	
〃 ②	2	若	0	0	20	0	12	0	0	0	オオタバコガ4%
B地区 ①	2	中	0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	2	老	0	0	0	0	0	0	0	0	
C地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	2	0	0	
D地区 ①	6	中	0	0	0	0	0	0	0	0	シロイチモジヨトウ 2%、マメハムシヨウ4%
〃 ②	4	中	0	0	0	0	0	0	0	0	
E地区 ①	14	老	4	0	0	0	0	0	0	0	シロイチモジヨトウ 2%、オオタバコガ2% シロイチモジヨトウ 2%
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
F地区 ①	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
G地区 ①	14	中老	2	0	0	0	0	0	0	0	シロイチモジヨトウ2%
〃 ②	2		0	0	0	0	0	0	0	0	
H地区 ①	0		0	0	0	0	2	0	0	0	チョウ目若齢4%
〃 ②	0		0	0	0	0	2	0	0	0	
I地区 ①	2	中	0	0	0	0	0	6	0	0	オオタバコガ2%
〃 ②	0		0	0	0	0	0	2	0	0	
J地区 ①	0		0	2	0	0	2	0	0	0	イチモンジカメムシ、 シロイチモジヨトウ2%
〃 ②	4	中	0	4	0	0	14	6	0	0	イチモンジカメムシ、 トゲヘリカメムシ、 チョウ目若齢4%
K地区 ①	2	若	0	0	0	0	0	0	0	0	
〃 ②	14	若中	0	0	0	0	0	0	0	0	
発生圃場率	54.5		9.1	9.1	9.1	0	22.7	18.2	0	0	
平均発生株率	3.1		0.3	0.3	1.6	0	1.5	0.7	0	0	
発生率の平年値	4.4		1.6	0.3	0.9	0.3	2.5	—	3.2	30.4	
（平年比）	並		やや少	並	やや多	並	並	—	やや少	少	
発生率の前年値	1.1		0.8	0.3	0	0.1	3.9	0.9	0.5	18.5	