

ノリ養殖情報（第1号）

令和元年10月11日（金）

月齢：12.4（中潮）佐賀県有明水産振興センター

10月27日の採苗日に向けて以下の点に注意し、カキ殻系状体の管理をしっかりと行ってください。

【系状体の管理】

白石町地先から竹崎沖にかけてスケルトネマおよびキートセロスによる赤潮がみられています。カキ殻の処理には、赤潮の着色が少ない海水を用いてください。

○個人培養の方

- 系状体の熟度は全体的には2型ですが、一部で3型以上に進んでいるものもみられています。
- 週間天気予報では、13日以降、朝晩が冷えてきますので、培養水温等の管理には十分注意してください。
- 早めに検鏡を行い、種の量と熟度の進み具合を確認した上で、下図を目安に処理を行ってください。

○カキ殻を購入する方

- 早めに受け取って熟度を確認し、処理を行ってください。特に、他県からカキ殻を購入する方は、早めの確認が必要です。
- カキ殻系状体を袋に入れたまま直射日光に長く当てると、蒸れ等により強い抑制がかかりますので、培養場から持ち帰る際には取り扱いに十分注意してください。カキ殻を持ち帰ってからも、分量の海水に入れるなど丁寧に扱ってください。


※カキ殻系状体の検鏡や今後の管理に関する相談は、土日祝（19、20、22日）もセンターで行っています。（時間：9時～17時 連絡：0952-66-2000）

系状体の熟度（センター基準）		18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
現在の胞子の熟度	2型（後期）	—————									ラッカサンに入れる	採苗日
	3型	-----										
	4型	-----										
	5型	-----										

----- 現状維持、————— かん水・カキ殻洗い、————— 培養小屋開放(冷却)

DINの水平分布

調査日：10月11日
単 位：μg・at/L
()内はスケルトネマとキートセロスの合計細胞数（細胞/mL）



【海況（10月11日調査結果）10定点平均：昼間満潮前後2時間】

- 水温は、23.9℃で平年（22.3℃）よりかなり高めです。
- 比重は、22.1でほぼ平年（21.6）並みです。
- 栄養塩（DIN）は、2.4μg・at/Lです。

◎ 週間天気予報（10月11日 17時 佐賀地方気象台発表）

予報	12日(土)	13日(日)	14日(月)	15日(火)	16日(水)	17日(木)	18日(金)
降水確率 %	☁	☀	☀時尺	☀時尺	☀時尺	☀時尺	☀
最高気温 °C	20	10	20	20	10	30	40
最低気温 °C	25	25	26	25	26	27	26
最低気温 °C	22	17	16	17	16	17	19