

# ノリ養殖情報（第4号）

令和元年11月6日（採苗開始から10日目）月齢9.0（長潮）  
佐賀県有明水産振興センター

## 【養殖概況】

- ・現在、展開、水位調整、網洗い作業が行われています。

## （ノリ芽の状況）

- ・本日の漁場調査（23点）の結果、芽イタミはほとんどなく、順調に生長しています。
- ・芽の大きさは、最大葉長の平均で0.56mm（最大：0.95mm）と例年より小さめです。
- ・二次芽は、23点中17点で確認されましたが、まだ本格化していません。

## （アオノリ等）

- ・マルバヤアオノリは確認されませんでした。
- ・汚れは全体的に少ない状況ですが、顕微鏡レベルの汚れ（主に付着珪藻）がみられています。

## 【今後の管理】

- ・これから二次芽の放出が本格化すると思われます。展開は、芽付きや二次芽の状況を確認しながら行ってください。
- ・ただし、栄養塩が低下している漁場では、岸寄りの漁場に、また、現在栄養塩のある漁場でも、今後の海況次第では、沖合漁場を中心に栄養塩が低下する恐れがありますので、栄養塩情報を参考にしながら展開漁場を検討してください。
- ・次回の栄養塩調査は、11月8日（金）に実施予定です。
- ・健全な芽を育てるために、網洗い、干出をしっかりと行ってください。

## 基準水位（網のハラ基準）


7日：2.2～2.4m、8日：2.0～2.1m

## （アオノリ対策の活性処理）

- ・活性処理の期間は、11月8日～11月20日となっています。
- ・活性処理は、150～200倍で浸漬時間6～8分を目安とし、ノリ芽が小さい場合は、薄めの濃度で時間をかけるようにしてください。

## 【海況（11月5日）10定点平均：昼間満潮時値】

- ・水温は、19.8℃で平年（18.8℃）より高めです。
- ・比重は、21.2と平年（21.5）並みです。
- ・栄養塩（DIN）は、下図のとおり10定点の平均で5.1μg・at/Lです。
- ・白石町地先から竹崎沖にかけて、キートセロスによる着色域が確認されています。



◎ 週間天気予報（11月6日 17時 佐賀地方気象台発表）

予報	7日(木)	8日(金)	9日(土)	10日(日)	11日(月)	12日(火)	13日(水)
	☀時々 ☁	☀時々 ☁	☀時々 ☁	☀のち ☁	☁	☀時々 ☁	☀時々 ☁
降水確率 %	10	20	20	30	40	20	20
最高気温 ℃	21	20	20	20	21	21	21
最低気温 ℃	10	10	10	8	13	11	10