

ノリ養殖情報（第5号）

令和7年11月14日（金） 月齢23.6（長潮）
（採苗開始から10日目） 佐賀県有明水産振興センター

【養殖概況】

- ・現在、網洗い、展開作業が行われています。

（ノリ芽の状況）

- ・本日の漁場調査の結果、芽付きは、網によって差（視野6～60個）がありますが、平均すると厚付き傾向でした。
- ・芽イタミはほとんどなく、芽の大きさは、最大葉長の平均で0.40mm（最大：0.69mm）で例年より小さめでした。
- ・二次芽は、18地点中13地点でごくわずかですが確認されました。

（アオノリ等）

- ・アオノリ、マルバは確認されませんでした。
- ・網汚れは、全体的に少ない状況ですが、顕微鏡レベルの汚れ（ボド、付着珪藻等）が見られました。

【今後の管理】

- ・健全なノリ芽を育てるためには干出が必要です。干出を十分に与えるとともに、網洗いにより網を汚さないようにしてください。
- ・これから二次芽の放出が本格化すると思われます。二次芽は干出直後に出る傾向にありますので、干出直後の網洗いは控えて下さい。
- ・また、芽付きの厚い網は早めに展開作業を行ってください。ただし、栄養塩が少ない漁場では、栄養塩情報を参考に展開漁場を検討してください。

11/15、16（土、日）の9～12時に、センターで検鏡対応いたします。

次回の海況速報は11月17日（月）の予定です。

- ・現在、潮位は潮汐表通りからやや低めで推移しています（下中表）。

水位は、現場で確認し、調整してください。

基準水位（網のハラ基準）

15～16日：2.1m、17日：2.0m、

18～19日：1.9～2.0m

- ・アオノリ対策で活性処理を行う場合、海況（水温等）やノリ芽の条件も違うため、使用前にノリ芽を使って芽イタミがないかの試験を行い、対応してください。

【海況】

- ・水温は、観測塔の昼間満潮時（17時）で17.3～17.4℃と
平年並み、比重は、21.9～22.1と平年並みです。

◎ 各観測タワーにおける水温と比重（昼間満潮時値）

地点	調査	水温（℃）				比 重			
		12日	13日	14日	平年値	12日	13日	14日	平年値
筑後川観測塔		-	17.2	-	17.9	-	20.1	-	21.5
早津江川観塔		17.7	-	-	18.2	22.1	-	-	22.2
六角川観測塔		17.0	16.9	17.4	16.9	21.7	21.3	21.9	21.1
浜川観測塔		17.5	-	17.3	17.2	22.2	-	22.1	21.7

◎六角観測タワーにおける干潮時の潮位変動

9日		10日		11日		12日		13日		14日	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
16	5	9	6	4	3	5	3	10	2	14	

・数字は実測値から潮汐表値を引いた値で、+は潮汐表よりも高めに推移していることを示す。（単位はcm）

◎ 週間天気予報（11月14日 17時 佐賀地方气象台発表）

予報	15日(土)	16日(日)	17日(月)	18日(火)	19日(水)	20日(木)	21日(金)
	☀	☀時々☁	☁時々☀	☁一時☔	☁時々☀	☁時々☀	☁時々☀
降水確率 %	0	10	30	50	30	30	30
最高気温 ℃	22	23	20	12	12	16	18
最低気温 ℃	9	8	9	7	5	5	7