

ノリ養殖情報（第16号）

令和8年1月30日（金） 月齢11.3（中潮）

（採苗開始から87日目、冷凍出庫から3日目）

佐賀県有明水産振興センター

【養殖概況】

- 現在、東中部では活性処理、西南部では摘採、網上げが行われています。

（病気等）

- 東中部の冷凍戻りは一部でやや不良でしたが、全般的には良好でした。
- 東中部では、針状細菌は10点中1点、原形質吐出は10点中4点（軽症）で確認されました。
- 東中部では、アカガ10点中1点（顕微鏡レベル）確認されました。西南部では、全地点（流出直前レベル2点、肉眼視レベル4点）で確認されました。
- ツボは確認されませんでした。
- 色落ちは、右図のとおり16点中8点で確認されました。


【今後の管理】

- 西南部では、冷凍網期の病害対策のためにも、生産不能網は速やかに撤去してください。
- 東中部では、病害対策のため、必ず干出を与え、管理を徹底したのちに活性処理を行い、ノリの健全度アップに努めてください。
- ノリの色が浅くなっても同様です。ただし、その場合には活性処理の濃度は通常よりも薄め（200～300倍）に行ってください。

【海況】


- 水温は、観測塔の昼間満潮時（7時半）で6.9～9.5°Cと平年並み、比重は、21.9～22.8と平年並みです。
- 栄養塩(DIN)の8点平均値は、0.2μg-at/Lです。
- 栄養塩(DIP)の8点平均値は、0.2μg-at/Lです。
- 川副町地先から白石町地先にかけてスケレトネマとキートセロスによる赤潮が確認されました。

次回の海況速報は2月2日（月）の予定です。



栄養塩の水平分布
調査日：1月30日
単位： $\mu\text{g} \cdot \text{at/L}$

※期待値は、DIN7以上、
DIP0.5以上です。



色落ち状況調査結果

（1月30日実施）

◎ 週間天気予報（1月30日 17時 佐賀地方気象台発表）

予報	31日(土)	1日(日)	2日(月)	3日(火)	4日(水)	5日(木)	6日(金)
	●時々 ☂	☂	☂	●時々 ☂	☂	☂	☂一時 ☂
降水確率 %	0	30	40	20	40	40	50
最高気温 °C	10	9	9	12	13	15	12
最低気温 °C	-3	2	2	2	2	5	4