

ノリ養殖情報 (第18号)

令和8年2月13日 (金) 月齢25.3 (若潮)
 (冷凍出庫から17日目) 佐賀県有明水産振興センター

栄養塩の水平分布
 調査日：2月13日

【海況】

- ・水温は、観測塔の昼間満潮時（7時）で7.3～8.6℃と平年より低め、比重は、19.2～22.3と平年よりやや低めです。
- ・栄養塩(DIN)の7点平均値は、0.3μg -at/Lです。
- ・栄養塩(DIP)の7点平均値は、0.3μg -at/Lです。
- ・六角川河口域から太良町地先にかけてスケルトネマとキートセロスによる赤潮が確認されています。

【養殖概況】

(病気等)

- ・東中部では、糸状細菌が10点中2点で確認されました。
- ・アカは、右図のとおり10点中6点で確認されました。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・色落ちは、10点中8点（色落ちレベル2.5～4）で確認されました。


【今後の管理】

- ・アカは、一部の漁場では重症化し、根アカが確認されています。
- ・病害対策のため、干出や活性処理などの管理をしっかり行い、ノリの健全度アップに努めてください。
- ・ノリの色が浅くなっても同様です。ただし、その場合には活性処理の濃度は通常よりも薄め（200～300倍）で行ってください。
- ・東中部の栄養塩が低下している漁場では、摘採サイズの網は色があるうちに摘採してください。


(出庫時の注意)

- ・西南部では、冷凍戻りをよくするため、出庫から海に流すまでの時間はできるだけ短くすることに留意して作業してください。
- ・アカグサレ病やスミノリ病対策のため、冷凍戻りを確認した網から、水位調整を行い、適正な干出を与え、じっくり養殖してください。

次回の栄養塩調査は2月17日（火）の予定です。



※期待値は、DIN7以上、DIP0.5以上です。



© 週間天気予報 (2月13日 11時 佐賀地方気象台発表)

予報	14日(土)	15日(日)	16日(月)	17日(火)	18日(水)	19日(木)	20日(金)
	☁のち 一時☔	☁時々 ☀	☁	☁時々 ☀	☁時々 ☀	☀時々 ☁	☀時々 ☁
降水確率 %	70	40	40	30	30	20	20
最高気温 °C	12	19	15	14	14	13	15
最低気温 °C	3	8	6	4	4	2	1