

ノリ養殖情報（第1号）

令和8年10月13日（火）

月齢2.5（中潮）

佐賀県有明水産振興センター

10月27日の採苗に向けて以下の点に注意し、カキ殻糸状体の管理を
しっかり行ってください。（※出港は26日17時以降）

【糸状体の管理】

- ・赤潮は確認されていません。カキ殻の処理には、比重20以上の海水を用いてください。
- ・なお、海水を汲んだ場合、海上では濁り等が見られますがカキ殻培養には問題ありません。気になる場合は、海水を1日以上暗黒状態で静置した後、上澄みを使用してください。

○個人培養の方

- ・気温の変化を見ながら、培養水温等の管理には十分注意してください。
- ・早めに検鏡を行い、種の量と熟度の進み具合を確認した上で、下図を目安に処理を行ってください。

○カキ殻を購入する方

- ・早めに受け取って熟度を確認し、処理を行ってください。
- ・特に、他県からカキ殻を購入する方は、早めの確認が必要です。
- ・カキ殻糸状体を袋に入れたまま直射日光に長く当てると、蒸れ等により強い抑制がかかりますので、培養場から持ち帰る際には取り扱いに十分注意してください。カキ殻を持ち帰ってからも、十分量の海水に入れるなど丁寧に扱ってください。

※カキ殻糸状体の検鏡や今後の管理に関する相談は、採苗前の土日(24、25日)もセンターで行っています。(時間：9～17時TEL：0952-66-2000)


次回の海況調査は10月19日（月）の予定です

糸状体の熟度 (センター基準)		18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		
現在の胞子の熟度	2型（後期）									ラッカサンに入れる	採苗日		
	3型												
	4型												
	5型												

----- 現状維持、—— かん水・カキ殻洗い、—— 培養小屋開放(冷却)

栄養塩の水平分布

調査日：10月13日



※期待値は、DIN7以上、
DIP0.5以上です。

【海況（10月13日調査結果）10点平均：昼間満潮前後2時間】

- ・水温は、24.8℃で、平年（22.5℃）よりかなり高めです。
- ・比重は、22.6で、平年（21.6）よりやや高めです。
- ・栄養塩(DIN：窒素)は、16.4μg・at/Lです。
- ・栄養塩(DIP：リン)は、1.3μg・at/Lです。

◎ 週間天気予報（10月13日 11時 佐賀地方气象台発表）

予報	14日(水)	15日(木)	16日(金)	17日(土)	18日(日)	19日(月)	20日(火)
	☁のち ☀	☀時々 ☁	☁時々 ☀	☀時々 ☁	☁時々 ☀	☁一時 ☔	☁一時 ☔
降水確率 %	20	20	20	10	30	50	50
最高気温 ℃	25	25	28	29	28	25	24
最低気温 ℃	19	12	13	15	17	19	18