ノリ養殖情報（第2号）

令和8年10月23日（金）　月齢12.5（中潮）

佐賀県有明水産振興センター

10月29日の採苗に向けて以下の点に注意し、カキ殻糸状体の管理をしっかり行ってください。（※出港は28日17時以降）
また、採苗時は低比重に注意して下さい。


【糸状体の管理】

○個人培養の方
- 気温の変化を見ながら、培養水温等の管理には十分注意してください。
- 種の量と熟度の進み具合を確認した上で、下図を目安に処理を行ってください。


○カキ殻を購入する方
- 受け取り後、カキ殻の熟度を確認し、処理を行ってください。
- カキ殻糸状体を袋に入れたまま直射日光に長く当てると、蒸れ等により強い抑制がかかりますので、培養場から持ち帰る際には取り扱いに十分注意してください。カキ殻を持ち帰ってからも、十分量の海水に入れるなど丁寧に扱ってください。

※カキ殻糸状体の検鏡や今後の管理に関する相談は、採苗前の土日(24、25日)もセンターで行っています。(時間：9～17時TEL：0952-66-2000)

【採苗時の注意】
- 台風30号の影響次第では、比重の低下が考えられます。採苗時の朝方の比重が15以下になりますと、種の放出・着生が著しく抑制され、10以下になりますと止まります。その場合は、比重の高い場所を選定するなど対策をとってください。
- 天気予報では、採苗日の天気は晴れとなっており、その日から種は付着すると思われますので、芽付きの確認を行ってください。なお、芽付きの確認は、なるべく午後に行ってください。
- 近年、芽付きが厚い傾向にあります。アカグサレ病対策のため、芽付きは、蛍光顕微鏡100倍視野（2.2mm）で１視野あたり８～10個を目安としましょう。



栄養塩の水平分布
調査日：10月23日



※期待値は、DIN7以上、DIP0.5以上です。

【海況（10月23日調査結果）9点平均：昼間満潮前後2時間 】
- 水温は、22.7℃で、平年（20.8℃）よりかなり高めです。
- 比重は、22.4で、平年（21.4）よりやや高めです。
- 栄養塩(DIN：窒素)は、8.8μg・at/Lです。
- 栄養塩(DIP：リン)は、0.7μg・at/Lです。

次回の海況調査は10月28日（水）の予定です

◎ 週間天気予報（10月23日　11時　佐賀地方気象台発表）

予報	24日(土)	25日(日)	26日(月)	27日(火)	28日(水)	29日(木)	30日(金)
	時々		時々	一時	時々	時々	一時
降水確率　%	70	90	70	50	20	20	50
最高気温　℃	29	24	26	24	21	22	22
最低気温　℃	21	22	19	16	12	11	15