# ノリ養殖情報（第3号）

令和8年10月28日（水）　　月齢17.5（中潮）

佐賀県有明水産振興センター

## 厚付きに注意！適正芽付きに心がけましょう。

【採苗時の注意】

・珪藻類赤潮は終息しました。
・採苗時は比重に注意してください。カキ殻が低比重（15未満）にさらされる時間が長くなると、種の放出・着生が抑制されます。
・近年、芽付きが厚い傾向にあります。アカグサレ病対策のため、芽付きは、蛍光顕微鏡100倍視野（2.2mm）で１視野あたり８～10個を目安としましょう。

【採苗後の管理】

・現在、潮位はほぼ潮汐表どおりに推移しています（表参照）。水位は現場で確認し、干出時間は1～2時間を目処としてください。なお、比重が低く、風が強い、気温が高いときなどは干出過多に注意してください。
・ノリ芽は、低比重（15未満）に浸かった後に乾燥させた場合、重度の芽痛み（芽落ち）を起こします。干出過多に注意し、乾き具合を確認しながら、干出時間を調整してください。


※芽付きの検鏡や相談は、土日(31日、1日)もセンターで行っています。
(時間：9～17時 TEL：0952-66-2000)

【海況（10月28日調査結果）10点平均：昼間満潮前後2時間 】

・ 水温は、22.0℃で、平年（20.8℃）より高めです。
・ 比重は、21.7で、平年（21.4）並みです。
・ 栄養塩(DIN：窒素)は、16.3μg・at/Lです。
・ 栄養塩(DIP：リン)は、1.3μg・at/Lです。

**次回の海況調査は11月2日（月）の予定です**

栄養塩の水平分布
調査日：10月28日




DIN（μg・at/L）
DIP（μg・at/L）

※期待値は、DIN7以上、DIP0.5以上です。

◎六角観測タワーにおける干潮時の潮位変動

| 23日 | | 24日 | | 25日 | | 26日 | | 27日 | | 28日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| －17 | －5 | －5 | ＋12 | ＋8 | －1 | 欠 | ＋3 | 欠 | －10 | 0 | |

・数字は実測値から潮汐表値を引いた値で、＋は潮汐表よりも高めに推移していることを示す。（単位はcm）

◎ 週間天気予報（10月28日　11時　佐賀地方気象台発表）

| 予報 | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☀のち一時☂ | ☘一時☂ | ☀時々☘ | ☘時々☀ | ☘一時☂ | ☘時々☀ | ☀時々☘ |
| 降水確率　％ | 70 | 70 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 |
| 最高気温　℃ | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| 最低気温　℃ | 10 | 16 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 |