ノリ養殖情報（第4号）

令和8年11月4日（水）　月齢24.5（長潮）
（採苗開始から6日目）　佐賀県有明水産振興センター

【養殖概況】
・10月29日から開始された採苗は、概ね11月1日に終了しました。
・現在、網洗い、人工干出、一部で展開作業が行われています。

（ノリ芽の状況）
・本日の漁場調査の結果、芽付きは、網によって差（視野7～23個）がありますが、平均するとやや厚付き傾向でした。
・芽イタミはほとんどなく、芽の大きさは、最大葉長の平均で0.20㎜（最大：0.30㎜）で平年よりやや大きめでした。

（アオノリ等）
・アオノリ、マルバは確認されませんでした。
・網汚れは、**ボドやリクモ等の付着珪藻汚れが多くの網で見られました。**

【今後の管理】
・今後、曇りがちな天気予報が続きますが、**健全なノリ芽を育てるために、網洗い、干出を行ってください。**
・また、早めに10～15枚展開を行ってください。
・ノリ芽は低比重（比重15未満）の海水に浸かった後に乾燥させた場合、重度の芽イタミを起こします。比重が低い漁場では、網の乾き具合を確認し、乾燥過多に注意してください。
・現在、潮位はやや低めで推移しています（右上表）。水位は、現場で確認し、干出時間は1～2時間を目処として調整してください。

基準水位（網のハラ基準）
5日－1.7m、6～8日－1.6m、9日－1.7m、10日－1.8m

・アオノリ対策で活性処理を行う場合、海況（水温等）やノリ芽の条件も違うため、使用前にノリ芽を使って芽イタミがないかの試験を行い、対応してください。

【海況 】
・水温は、観測塔の昼間満潮時（17時30分）で19.9～21.4℃と平年よりかなり高め、比重は20.3～21.6と平年並みです。
なお、昼間干潮時の比重は下表のとおりです。

次回の海況調査は11月5日（木）の予定です

◎六角観測タワーにおける干潮時の潮位変動

30日		31日		1日		2日		3日		4日	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
＋5	－4	－3	－11	－3	－2	＋6	－9	－11	－18	－6	

・数字は実測値から潮汐表値を引いた値で、＋は潮汐表よりも高めに推移していることを示す。（単位はcm）

◎ 各観測タワーにおける水温と比重（昼間満潮時値）

地点	調査	水温（℃）				比　重			
		2日	3日	4日	平年値	2日	3日	4日	平年値
筑後川観測塔		21.6	20.8	21.3	19.3	19.7	18.9	21.0	20.8
早津江川観測塔		22.0	21.0	21.4	19.6	-	-	20.3	21.5
網洗い地点		21.4	21.2	20.8	-	21.0	21.2	21.0	-
六角川観測塔		20.7	19.8	20.1	18.5	20.6	18.9	21.0	20.9
浜川観測塔		21.2	20.4	19.9	18.7	21.9	21.7	21.6	21.3

◎ 週間天気予報（11月4日　17時　佐賀地方気象台発表）

予報	5日(木)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
	☘時々☂	☀時々☘	☀時々☘	☘時々☀	☘	☘	☀時々☘
降水確率　%	70	10	10	30	40	40	20
最高気温　℃	21	22	19	19	18	17	19
最低気温　℃	15	13	11	10	11	10	8