

# ノリ養殖情報 (第2号)

令和4年10月24日 月齢28.2 (大潮)  
佐賀県有明水産振興センター

## 厚付きに注意しましょう！！

### 【海況】

- ・筑後川河口域から鹿島市地先にかけて、キートセロスによる着色域が確認されましたが、細胞数は全域で減少傾向にあります。
- ・水温は、観測タワーの昼間満潮時（8時30分）で21.4～22.3℃で平年より高め、比重は、19.7～22.4で平年並みです。
- ・栄養塩（DIN）は右図のとおり10点平均で0.3μg・at/Lです。

### 【採苗時の注意】

- ・全体的に栄養塩が少ないですが、水温などを含め、採苗には問題ありません。
- ・天気予報によれば、採苗日の天候は晴れで水温も下がっていることから、採苗当日から種は付着すると思われしますので、必ず芽付きの確認をしてください。
- ・近年、芽付きが厚い傾向にあります。病害対策等のため、芽付きは、蛍光顕微鏡100倍視野（2.2mm）で1視野あたり8～12個を目安としましょう。

### 【採苗後の管理】

- ・現在、潮位は潮汐表よりも低めで推移しています（下表参照）。水位は現場で確認し、干出時間は1～2時間を目処としてください。

※芽付きの検鏡や相談は、土日（29、30日：9時～17時）もセンターで行っています。

### ◎六角観測タワーにおける干潮時の潮位変動

19日		20日		21日		22日		23日		24日	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	46	45		38	39	31	23	23	18	17	


・数字は実測値から潮汐表値を引いた値で、+は潮汐表よりも高めに推移していることを示す。（単位はcm）

### ◎各観測タワーにおける水温と比重（昼間満潮時値）

地点	調査	水温 (°C)				比重			
		22日	23日	24日	平年値	22日	23日	24日	平年値
筑後川観測塔		22.4	22.5	22.1	20.9	22.4	22.5	22.4	21.0
早津江川観測塔		21.9	22.3	22.3	21.2	20.5	20.0	19.7	22.1
六角川観測塔		21.1	21.6	21.5	20.3	21.6	21.6	21.5	21.1
浜川観測塔		21.1	21.5	21.4	20.5	21.0	20.8	20.8	21.4

DINの水平分布  
調査日：10月24日  
単位：μg-at/L

( )：キートセロス細胞数  
単位：細胞/mL



### ◎週間天気予報（10月24日 11時 佐賀地方気象台発表）

予報	25日(火)	26日(水)	27日(木)	28日(金)	29日(土)	30日(日)	31日(月)
天気	☁のち ☀	☀時々 ☁	☁時々 ☀	☀時々 ☁	☀時々 ☁	☀時々 ☁	☀時々 ☁
降水確率 %	20	10	20	20	20	20	20
最高気温 °C	20	22	23	24	23	23	24
最低気温 °C	13	12	12	13	14	14	13